

「コロナワクチン」



(44)

皆さんが毎年接種して 現在、複数社のものが使われているインフルエ
ンザワクチンは、ウイルス 免疫獲得に三〜四週間か
の毒性をなくし免疫を作 かると言われています。一
るのに必要な成分だけを 回目と二回目の間隔を数
製剤にした不活化ワクチ 週間あけ、二回目接種後
ンという種類のものです。 も直ちに効果が十分発揮
一方、現在日本で接種 されるわけではありませ
されているコロナワクチン ん。

接種後に現れる主な副 反応には、接種後三日以
(mRNA)ワクチンとい 内に接種部位の痛みや腫
う新しい種類のもので、こ れ、発熱、倦怠感、頭痛な
のmRNAはウイルスの どがみられ、一回目よりも
外側のタンパク質を体内 二回目、また若年者の発
で作らせるように設計さ れていて、この特徴的なタ
ンパク質に対して抗体が 生頻度の方が高いと報告
作られ、免疫が高まると されています。二回目の発
いうものです。RNAを体 生頻度が高いのは、一回目
内に入れるというとし にくらか免疫がつくこ
怖い気もしますが、この とで二回目の免疫反応が
mRNAは短時間で分解 起こりやすくなるためと
されるので、体内の遺伝情 考えられています。ですが
報(DNA)に影響するも ほとんどは一〜二日で治
のではないと考えられて ると言われ、免疫反応が
います。 きちんと働いている証拠
でもあります。高熱や痛

今回のワクチンは、二回 みが辛い場合は市販の解
接種する必要があります。 熱鎮痛剤で対応できます。

仕事に影響させたくない
人は休みの前日に接種す
ることで回避できると思
います。副反応による健
康被害のリスクとワクチ
ンを打たずに感染するリ
スクを天秤にかければ、ワ
クチンを打たないリスク
の方がはるかに大きいと
いう考えが一般的です。

私が二回目を接種した
ときも熱が三十八度まで
上がり、インフルエンザに
かかったときのような関
節痛やだるさがありまし
たが、二日後には治り普
段通りの生活を送れまし
た。

薬局では接種に関する
相談を受け付けてますの
で、気軽に声をかけ下さ
い。

五香薬局実習生 岩上紗弥

応援します、健康家族!

(有)安藤薬局五香薬局
松戸市常盤平5-17-15
☎047・385・0260



問 ☎047・360・3600

一般社団法人松戸市薬剤師会